

TIRANO ORIENTAL

Tyrannus tyrannus (Linnaeus, 1758)

Características: Alrededor de 22 cm de largo. Cuerpo con plumaje negro grisáceo en el dorso, gris claro en los costados y pecho y blanco en el vientre. Cola negra con puntas blancas.


Hábitat: En diversidad de hábitats. Se le ve perchado en la punta de los árboles.

Alimentación: Insectos. Ocasionalmente vertebrados pequeños y frutos.

Estado de conservación: Menor preocupación a nivel mundial.

Distribución: De Canadá a Argentina.

Poblaciones en Guatemala: Migratorias.





TIRANO PÁLIDO •

Tyrannus verticalis Say, 1823

Características: Alrededor de 22 cm de largo. Cuerpo con plumaje verde grisáceo en el dorso, gris blanquecino en el pecho y amarillo en el vientre.


Hábitat: En áreas abiertas, bordes de camino, ciudades y plantaciones.

Alimentación: Insectos.

Estado de conservación: Menor preocupación a nivel mundial.

Distribución: De Canadá a Panamá y Caribe.

Poblaciones en Guatemala: Migratorias.



FAMILIA VIREONIDAE

Vireos

Aves pequeñas, con cuerpo robusto. Picos gruesos, de colores oscuros. Plumaje de colores cafés, verdes, amarillos, negros y blancos. Patas azul grisáceo. Se alimentan de insectos y frutos.

VIREÓN CEJIRRUFO

Cyclarhis gujanensis (Gmelin, 1789)



Características: Alrededor de 17 cm de largo. Rostro y nuca grisácea, plumaje superior del ojo naranja. Parte inferior amarilla. Ojos amarillo anaranjados. Pico grueso, rosado grisáceo.


Hábitat: Bosques secos, semidecíduos, riparios, lluviosos, manglares y plantaciones de café.

Alimentación: Omnívoros, se alimentan de insectos principalmente.

Estado de conservación: Preocupación menor a nivel mundial.

Distribución: De México a Argentina.

Poblaciones en Guatemala: Residentes.



VIREO DE BELL

Vireo bellii Audubon, 1844





Características: Alrededor de 13 cm de largo. Cuerpo con plumaje amarillo opaco a brillante en el vientre. Alas con dos barras blancas. Ojos oscuros con contorno blanco.

Hábitat: En matorrales costeros, bosque espinoso y áreas perturbadas. Alimentación: Insectos.

Estado de conservación: Casi amenazada a nivel mundial.

Distribución: De Estados Unidos a Nicaragua.

Poblaciones en Guatemala: Migratorias.



VIREO VERDEAMARILLO

Vireo flavoviridis (Cassin, 1851)

Características: Alrededor de 14 cm de largo. Cuerpo con plumaje olivo en el dorso y blanquecino en el pecho y vientre. Corona gris. Ojos rojos, pico negro con la base amarilla. Patas azul grisáceo.


Hábitat: En bosques riparios, plantaciones y matorrales.

Alimentación: Insectos.

Estado de conservación: Menor preocupación a nivel mundial.

Distribución: De Canadá a Brasil.

Poblaciones en Guatemala: Migratorias.





VIREO DE HUTTON

Vireo huttoni (Cassin, 1851)

Características: Alrededor de 12 cm de largo. Cuerpo con plumaje verde oliva en el dorso y verde claro en el vientre. Cola marrón negruzco, con líneas blanquecinas en los bordes. Pico y patas grisáceos.


Hábitat: En bosques siempreverdes y de pino y encino.

Alimentación: Insectos.

Estado de conservación: Menor preocupación a nivel mundial.

Distribución: De Canadá a Guatemala y Belice.

Poblaciones en Guatemala: Residentes.



VIREO PLOMIZO

Vireo plumbeus Coues, 1866

Características: Alrededor de 13 cm de largo. Cuerpo con plumaje gris en cabeza y dorso, blanco en pecho y vientre y negro en las alas. Anillo blanco alrededor de los ojos, interrumpido por una franja negra hacia la base del pico. Patas azul grisáceo.


Hábitat: En bosques de pino y encino.

Alimentación: Insectos.

Estado de conservación: Menor preocupación a nivel mundial.

Distribución: De Estados Unidos a El Salvador y Honduras.

Poblaciones en Guatemala: Residentes.




VIREO SOLITARIO

Vireo solitarius (Wilson, 1810)



Características: Alrededor de 14 cm de largo. Cuerpo con plumaje verde olivo en el dorso, blanco en la garganta y amarillo en los costados.

Hábitat: En una gran variedad de bosques.



Alimentación: Insectos.

Estado de conservación: Menor preocupación a nivel mundial.

Distribución: De Canadá a Nicaragua.

Poblaciones en Guatemala: Migratorias.



FAMILIA CORVIDAE

Charas, urracas, cuervos

Aves medianas con plumaje brillante. Pico fuerte y recto. Son muy bulliciosos y sociables. Se alimentan de insectos, frutos, semillas, carroña y pequeños vertebrados.

URRACA, CHARA

Cyanocitta stelleri (Gmelin, 1788)

Características: Alrededor de 29 cm de largo. Cuerpo con plumaje azul-morado. Garganta blanca con manchas negras. Cara negra con franja blanca gruesa sobre el ojo. Cabeza con cresta pequeña y clara.


Hábitat: Bosques de pino y encino, y sabanas con pino.

Alimentación: Frutos, semillas, insectos, vertebrados pequeños.

Estado de conservación: Preocupación menor a nivel mundial.

Distribución: De Canadá a Nicaragua.

Poblaciones en Guatemala: Residentes.



CHARA CENTROAMERICANA •

Cyanocorax melanocyaneus (Hartlaub, 1844)



Características: Alrededor de 30 cm de largo. Cuerpo con plumaje negro en cabeza y pecho, y azul en el vientre y alas. Ojos amarillos, pico y patas negras. Cola azul oscuro.


Hábitat: En una gran variedad de bosques.

Alimentación: Insectos.

Estado de conservación: Menor preocupación a nivel mundial.

Distribución: De Guatemala a Nicaragua.

Poblaciones en Guatemala: Residentes.



FAMILIA HIRUNDINIDAE

Golondrinas

Aves pequeñas, con plumaje oscuro en el dorso y claro en el vientre. Pico y patas pequeñas. Alas largas y puntiagudas. Cola cuadrada o bifurcada. Gregarios.

GOLONDRINA ALISERRADA •

Stelgidopteryx serripennis (Audubon, 1838)



Características: Alrededor de 14 cm de largo. Cuerpo con plumaje café en el dorso y cabeza, café blanquecino en la garganta, y blanquecino en el abdomen. Cola cuadrada, con la parte inferior blanca. Parte interior de las alas, oscura.


Hábitat: Ambientes abiertos a semi abiertos. Común en ciudades.

Alimentación: Insectos.

Estado de conservación: Preocupación menor a nivel mundial.

Distribución: De Canadá a Panamá.

Poblaciones en Guatemala: Residentes.



FAMILIA AEGITHALIDAE

Sastrecillos

Aves pequeñas, con plumaje grisáceo y ojos negros. Cola larga y cuadrada.

MITO SASTRECILLO

Psaltiriparus minimus (Townsend, 1837)



Características: Alrededor de 11 cm de largo. Cuerpo con plumaje grisáceo. Las mejillas son negras en los machos y cafés en las hembras. Los ojos son negros en los machos y claros en las hembras.


Hábitat: En bosques de pino y encino.

Alimentación: Insectos y arañas.

Estado de conservación: Preocupación menor a nivel mundial.

Distribución: De Canadá a Guatemala.

Poblaciones en Guatemala: Residentes.



FAMILIA TROGLODYTIDAE

Matracas, saltaparedes

Aves pequeñas a medianas, con plumaje con tonos grisáceos, negros y blanquecinos. Pico largo y delgado. Son bulliciosas.

MATRACA TROPICAL •

Campylorhynchus zonatus (Lesson, 1832)



Características: Alrededor de 20 cm de largo. Cuerpo con plumaje rayado con blanco negro y marrón en el dorso, alas y cola. Corona marrón grisáceo. Pecho y garganta color blanco moteado. Vientre color canela. Juveniles con pecho gris pálido.


Hábitat: En bosques siempreverdes, y de pino y encino.

Alimentación: Insectos y frutos.

Estado de conservación: Preocupación menor a nivel mundial.

Distribución: De México a Colombia.

Poblaciones en Guatemala: Residentes.



SALTAPARED ROQUERO •

Salpinctes obsoletus (Say, 1823)



Características: Alrededor de 14 cm de largo. Cuerpo con plumaje café grisáceo en cabeza, dorso, alas y cola. Garganta y pecho blancos. Vientre color canela lavado. Patas gris oscuro.



Hábitat: En áreas abiertas áridas o semiáridas, con vegetación escasa.

Alimentación: Insectos.

Estado de conservación: Menor preocupación a nivel mundial.

Distribución: De Canadá a Costa Rica.

Poblaciones en Guatemala: Residentes.



FAMILIA TURDIDAE

Zorzales, azulejos

Aves pequeñas a medianas, con plumaje café, blanco y negro. Pico delgado y patas muy largas. Cola larga y cuadrada. Poseen cantos melódicos y llamativos.

AZULEJO GORJICANELO*Sialia sialis* (Linneo, 1758)

Características: Alrededor de 17 cm de largo. Plumaje azul en la cabeza y dorso, canela en el pecho y blanco en el vientre. Alas y cola de color azul oscuro. En las hembras, el dorso y la cabeza de color marrón grisáceo.


Hábitat: Bosques semi húmedo de pino y encino, y lugares áridos.

Alimentación: Insectos.

Estado de conservación: Preocupación menor a nivel mundial.

Distribución: De Canadá a Nicaragua y el Caribe.

Poblaciones en Guatemala: Residentes.



CENZONTLE COMÚN •

Turdus grayi (Bonaparte, 1838)

Características: Alrededor de 25 cm de largo. Cuerpo con plumaje café grisáceo a café oscuro en la cabeza, dorso. Garganta clara con rayas beige. Parte inferior beige a rojizo. Pico amarillo verdoso y patas rosadas.


Hábitat: En áreas abiertas, bordes de bosque y jardines.

Alimentación: Insectos, frutos y pequeños reptiles.

Estado de conservación: Menor preocupación a nivel mundial.

Distribución: De Estados Unidos a Colombia.

Poblaciones en Guatemala: Residentes.



CENZONTLE CUELLIRUFO

Turdus rufitorques Hartlaub, 1844

Características: Alrededor de 25 cm de largo. Cuerpo con plumaje negro en el dorso; rojizo anaranjado en el pecho y rojizo pálido en la garganta. Pico y patas amarillos. Las hembras con plumaje gris en el dorso y rayado en la garganta. Los juveniles similares a las hembras.



Hábitat: En bosques de pino y encino y bordes de bosques.

Alimentación: Insectos y frutos.

Estado de conservación: Menor preocupación a nivel mundial.

Distribución: En Guatemala, Honduras y El Salvador.

Poblaciones en Guatemala: Residentes.



FAMILIA MIMIDAE

Cenzontles, mulatos

Aves medianas, con plumaje café, gris, blanco y negro. Pico delgado y largo, generalmente curvo. Alas redondeadas. Patas y cola larga. Poseen cantos bulliciosos y variados, también imitan los de otras especies.

MULATO PECHIBLANCO



Melanotis hypoleucus (Hartlaub, 1852)

Características: Alrededor de 25 cm de largo. Plumaje azul grisáceo en la cabeza y dorso, blanco en la garganta, pecho y vientre. Ojos rojos con un anillo negro que se extiende como una franja hasta la base del pico. Pico y patas negros. Juveniles con plumaje grisáceo en la cabeza y dorso, y moteado en la garganta y pecho.


Hábitat: Bosques de pino y encino, bordes de bosques.

Alimentación: Insectos y frutos.

Estado de conservación: Preocupación menor a nivel mundial.

Distribución: De México a Honduras y El Salvador.

Poblaciones en Guatemala: Residentes.



CENZONTLE

Mimus gilvus (Vieillot, 1808)

Características: Alrededor de 26 cm de largo. Cuerpo con plumaje grisáceo en el dorso y más claro en la parte inferior. Alas negras con barras blancas variables. Cola larga y redondeada, con manchas blancas en los extremos de las puntas.


Hábitat: En áreas abiertas, cultivos y playas. Se les observa perchadas en el cableado eléctrico.

Alimentación: Insectos y frutos.

Estado de conservación: Menor preocupación a nivel mundial.

Distribución: De México a Brasil, y el Caribe.

Poblaciones en Guatemala: Residentes.



FAMILIA PTILONOTIDAE

Capiluneros

Aves medianas, con cola larga y pico pequeño. El plumaje puede ser gris, blanco o negro. Construyen sus nidos con plantas y líquenes.

CAPULINERO GRIS

Ptilonotus cinereus Swainson, 1827



Características: Alrededor de 20 cm de largo. Plumaje azul grisáceo en la cabeza, dorso y pecho; gris en la garganta. Cola larga y blanca en la base. Las hembras con cabeza gris y dorso verde olivo.



Hábitat: Bosques siempre verdes, de pino y encino, húmedos o semiáridos.

Alimentación: Insectos y frutos.

Estado de conservación: Preocupación menor a nivel mundial.

Distribución: De Estados Unidos a Guatemala.

Poblaciones en Guatemala: Residentes.



FAMILIA FRINGILLIDAE

Fringílidos, dominicos, eufonías

Aves medianas, con colores llamativos. Con pico grueso y patas cortas. Alas largas y puntiagudas. Cola corta y bifurcada. Con vocalizaciones variadas, algunas pueden imitar el canto de otras aves.

DOMINICO CABECINEGRO

Carduelis notata Du Bus de Gisignies, 1847

Características: Alrededor de 11 cm de largo. Plumaje negro en cabeza y pecho; amarillo olivo en el dorso; amarillo en la parte inferior. Alas negras con franja amarilla en el centro. Las hembras con cabeza amarillo olivo.


Hábitat: En praderas, bordes de bosques y cultivos de café.

Alimentación: Semillas.

Estado de conservación: Preocupación menor a nivel mundial.

Distribución: De México a Nicaragua.

Poblaciones en Guatemala: Residentes.



DOMINICO DORSIOSCURO •

Carduelis psaltria (Say, 1823)



Características: Alrededor de 11 cm de largo. Cuerpo con plumaje negro en la cabeza y dorso; amarillo en garganta y vientre; gris en los muslos. Alas negras con franjas blancas. En las hembras, la cabeza y el dorso son verde olivo grisáceos.


Hábitat: En áreas abiertas y semi abiertas con árboles dispersos.

Alimentación: Semillas, insectos y flores.

Estado de conservación: Menor preocupación a nivel mundial.

Distribución: Del oeste de Estados Unidos a Perú.

Poblaciones en Guatemala: Residentes.



EUFONIA CAPUCHA AZUL •

Euphonia elegantissima (Bonaparte, 1838)

Características: Alrededor de 11 cm de largo. Cuerpo con plumaje azul turquesa en la cabeza; azul oscuro en la cara y garganta; azul brillante en las alas; anaranjado rojizo en la garganta; anaranjado oscuro en el pecho y abdomen. Las hembras también poseen la cabeza azul turquesa, pero el resto del cuerpo es verde olivo.


Hábitat: Bosques de pino y encino, siempre verdes y áreas abiertas.

Alimentación: Insectos y frutos.

Estado de conservación: Menor preocupación a nivel mundial.

Distribución: De México a Panamá.

Poblaciones en Guatemala: Residentes.




EUFONIA CAPUCHA AZUL •

Loxia curvirostra Linnaeus, 1758

Características: Alrededor de 15 cm de largo. Cuerpo con plumaje rojizo anaranjado en los machos, y amarillo olivo en las hembras. Con la punta de la parte superior e inferior del pico cruzadas.

Hábitat: Bosques de pino y encino, y sabanas de pino.



Alimentación: Semillas, brotes de árboles, insectos. .

Estado de conservación: Menor preocupación a nivel mundial.

Distribución: De Canadá a Nicaragua.

Poblaciones en Guatemala: Residentes.



FAMILIA PARULIDAE

Chipes

Aves pequeñas, activas. Con colores llamativos. Picos delgados y puntiagudos, patas delgadas. El género *Setophaga* es el más abundante de esta familia, y está constituido por aves migratorias.

CHIPE GORRA RUFA •

Basileuterus rufifrons (Swainson, 1838)



Características: Alrededor de 12 cm de largo. Plumaje rojo en la cabeza; verde olivo en el dorso; amarillo en la garganta y pecho; blanco en el vientre. Juveniles con plumaje café en el dorso, con dos bandas canela en las alas.


Hábitat: En áreas semiabiertas, bosques secundarios y bordes de bosques.

Alimentación: Insectos y frutas.

Estado de conservación: Preocupación menor a nivel mundial.

Distribución: De Estados Unidos a Bolivia.

Poblaciones en Guatemala: Residentes.



CHIPE DE COLLAR •

Cardellina canadensis (Linnaeus, 1776)

Características: Alrededor de 13 cm de largo. Cuerpo con plumaje gris en el dorso, cabeza y cola. Línea amarilla desde el pico a la parte superior de los ojos.


Hábitat: Bosques de pino y encino, y sabanas de pino.

Alimentación: Semillas, brotes de árboles, insectos.

Estado de conservación: Menor preocupación a nivel mundial.

Distribución: De Canadá a Nicaragua.

Poblaciones en Guatemala: Residentes.




REINITA CARIRROJA •

Cardellina rubrifrons (Guraud, 1841)

Características: Alrededor de 13 cm de largo. Cuerpo con plumaje gris claro en el dorso. Cabeza con colores llamativos, con plumaje rojo en la cara y negro en la corona, que se extiende a los lados. Alas con una barra blanca.

Hábitat: Bosques de pino y encino, y sabanas de pino.

Alimentación: Insectos.



Estado de conservación: Menor preocupación a nivel mundial.

Distribución: De Estados Unidos a Honduras y El Salvador.

Poblaciones en Guatemala: Migratorias.

REINITA PLAÑIDERA

Geothlypis philadelphia (Wilson, 1810)

Características: Alrededor de 13 cm de largo. Cuerpo con plumaje amarillo olivo en el dorso y grisáceo en la cabeza. Un parche negro en el pecho, únicamente en machos.


Hábitat: Bosques secundarios y bordes de bosques.

Alimentación: Insectos.

Estado de conservación: Menor preocupación a nivel mundial.

Distribución: De Canadá a Ecuador.

Poblaciones en Guatemala: Migratorias.



MASCARITA PICO GRUESO

Geothlypis poliocephala Baird, 1865



Características: Alrededor de 14 cm de largo. Cuerpo con plumaje gris en la cabeza; verde olivo en la corona y el dorso; amarillo en la garganta, pecho y vientre. Pico claro. Juveniles con cuerpo café olivo y barras verde limón en las alas.


Hábitat: Bosques degradados y matorrales.

Alimentación: Insectos.

Estado de conservación: Menor preocupación a nivel mundial.

Distribución: De Estados Unidos a Panamá.

Poblaciones en Guatemala: Residentes.



MASCARITA COMÚN •

Geothlypis trichas (Linnaeus, 1766)

Características: Alrededor de 13 cm de largo. Cuerpo con plumaje café olivo en la cabeza y dorso; amarillo brillante en el pecho. Cara con una máscara negra en los machos, con una franja gris en la parte superior.


Hábitat: Praderas y sitios con arbustos, generalmente, cercanos a cuerpos de agua dulce.

Alimentación: Insectos.

Estado de conservación: Menor preocupación a nivel mundial.

Distribución: De Canadá a Panamá.

Poblaciones en Guatemala: Migratorias.



CHIPE GUSANERO

Helmintheros vermivorum (Gmelin, 1789)



Características: Alrededor de 13 cm de largo. Con plumaje amarillo en la cabeza, garganta y pecho. Dorso, alas y cola, verde olivo. Una franja café al lado de la corona.


Hábitat: En bosque secundario, húmedo a semi árido.

Alimentación: Insectos.

Estado de conservación: Menor preocupación a nivel mundial.

Distribución: De Canadá a Bolivia y el Caribe.

Poblaciones en Guatemala: Migratorias.



REINITA GRANDE

Icteria virens (Linnaeus, 1758)



Características: Alrededor de 18 cm de largo. Con plumaje oliva amarillento en el dorso y amarillo brillante en el pecho y garganta. Plumaje negro delante del ojo, y grisáceo atrás, con bordes blancos.


Hábitat: En bosque secundario, y plantaciones de café.

Alimentación: Insectos, bayas y frutos silvestres.

Estado de conservación: Menor preocupación a nivel mundial.

Distribución: De Canadá a Panamá.

Poblaciones en Guatemala: Migratorias.



CHIPE GUSANERO •

Mniotilta varia (Linnaeus, 1766)

Características: Alrededor de 13 cm de largo. Cuerpo con plumaje rayado blanco y negro. Los machos presentan la corona negra en época de reproducción. Las hembras poseen menos rayas en el pecho y garganta.


Hábitat: En bosque secundario, húmedo a semi árido.

Alimentación: Insectos.

Estado de conservación: Menor preocupación a nivel mundial.

Distribución: De Canadá a Bolivia y el Caribe.

Poblaciones en Guatemala: Migratorias.





PAVITO ALIBLANCO

Myioborus pictus (Swainson, 1829)

Características: Alrededor de 13 cm de largo. Cuerpo con plumaje negro en dorso y pecho; rojo en el abdomen. Una línea subocular blanca. Alas negras con una banda y puntas blancas. Pico y patas negras.



Hábitat: En bosque árido a semi húmedo de pino y encino.

Alimentación: Insectos.

Estado de conservación: Menor preocupación a nivel mundial.

Distribución: De Canadá a Nicaragua.

Poblaciones en Guatemala: Residentes.



CHIPE LORES NEGROS •

Oporornis tolmiei (Townsend, 1839)

Características: Alrededor de 13 cm de largo. Plumaje olivo en el dorso; gris en la cabeza y pecho; amarillo en el vientre. Garganta y pecho moteados con negro.


Hábitat: En bosques secundarios, húmedos a semi áridos.

Alimentación: Insectos.

Estado de conservación: Menor preocupación a nivel mundial.

Distribución: De Canadá a Panamá.

Poblaciones en Guatemala: Migratorias.



REINITA DE TENESSEE


Oreothlypis peregrina (Wilson, 1811)

Características: Alrededor de 13 cm de largo. Plumaje gris en la cabeza, con una línea oscura en el ojo. Plumaje blanco en la parte inferior.

Hábitat: En gran variedad de bosques.

Alimentación: Insectos, frutos, bayas.

Estado de conservación: Menor preocupación a nivel mundial.



Distribución: De Canadá a Ecuador.

Poblaciones en Guatemala: Migratorias.

CHIPE CEJAS BLANCAS

Parula superciliosa (Hartlaub, 1844)

Características: Alrededor de 12 cm de largo. Plumaje azul grisáceo en cabeza, alas y cola; verde en el dorso. Con una ceja blanca en la cara. Garganta y pecho amarillos. Una línea horizontal rojiza en la garganta. Vientre blanco. gris en la cabeza, con una línea oscura en el ojo. Plumaje blanco en la parte inferior.


Hábitat: En bosques de pino y encino, húmedos a semi áridos.

Alimentación: Insectos, frutos, bayas.

Estado de conservación: Menor preocupación a nivel mundial.

Distribución: De Estados Unidos a Nicaragua.

Poblaciones en Guatemala: Residentes.



CHIPE CACHETES AMARILLOS •

*Setophaga chrysoparia* (Sclater y Salvin, 1861)

Características: Alrededor de 13 cm de largo. Plumaje amarillo en la cara, con una banda negra desde la base del pico hasta el área de los oídos. Corona, dorso y garganta, negros. Pecho y vientre blancos, con líneas negras. Alas negras con barras blancas.


Hábitat: En bosques de pino y encino, húmedos a semiáridos.

Alimentación: Insectos.

Estado de conservación: En peligro.

Distribución: De Estados Unidos a Nicaragua.

Poblaciones en Guatemala: Migratorias.



REINITA GORJIAMARILLA •

*Setophaga dominica* (Linnaeus, 1766)

Características: Alrededor de 13 cm de largo. Plumaje con patrones en blanco y negro en la cabeza. Garganta amarilla. Plumaje inferior blanco, con líneas en los costados.


Hábitat: En bosques perturbados y plantaciones de café.

Alimentación: Insectos, frutos pequeños, bayas y néctar.

Estado de conservación: Menor preocupación a nivel mundial.

Distribución: De Estados a Colombia y el Caribe.

Poblaciones en Guatemala: Migratorias.



CHIPE RABADILLA AMARILLA •

Setophaga coronata (Linnaeus, 1766)



Características: Alrededor de 13 cm de largo. Plumaje grisáceo en cabeza y dorso. Rostro gris con anillo ocular o media luna blanca a gris. garganta amarilla. Cabeza negra.


Hábitat: En bosques de coníferas, bordes de bosque, pantanos y áreas abiertas.

Alimentación: Insectos, frutas y bayas.

Estado de conservación: Menor preocupación a nivel mundial.

Distribución: De Estados Unidos a Guatemala y el Caribe..

Poblaciones en Guatemala: Migratorias.



REINITA GORJINARANJA*Setophaga fusca* (Müller, 1776)

Características: Alrededor de 13 cm de largo. Plumaje negro en el dorso, con líneas blancas desordenadas. Corona negra con una línea brillante en el centro. Dos líneas blancas en las alas. Plumaje amarillo naranja en rostro y garganta.


Hábitat: En variedad de bosques y áreas perturbadas, como cultivos de café.

Alimentación: Insectos, frutas y bayas.

Estado de conservación: Menor preocupación a nivel mundial.

Distribución: De Canadá a Bolivia.

Poblaciones en Guatemala: Migratorias.



REINITA DE GRACE

Setophaga graciae (Baird, 1865)



Características: Alrededor de 13 cm de largo. Plumaje gris azulado en la parte superior. Pecho amarillo con líneas negras en los costados. Plumaje inferior blanco. Línea amarilla en la parte superior e inferior de los ojos.


Hábitat: En bosques mixtos de pino y encino, y sabanas de pino.

Alimentación: Insectos.

Estado de conservación: Menor preocupación a nivel mundial.

Distribución: De Estados Unidos a Nicaragua.

Poblaciones en Guatemala: Residentes.



REINITA DE MAGNOLIA

Setophaga magnolia (Wilson, 1811)



Características: Alrededor de 13 cm de largo. Plumaje amarillo olivo en el dorso; gris en la cabeza; amarillo en el vientre. Un anillo ocular blanco. Una banda negra ancha en la parte inferior de la cola.


Hábitat: En gran variedad de bosques.

Alimentación: Insectos.

Estado de conservación: Menor preocupación a nivel mundial.

Distribución: De Canadá a Colombia.

Poblaciones en Guatemala: Migratorias.



REINITA DE MANGLAR •

Setophaga petechia (Linnaeus, 1766)

Características: Alrededor de 11 cm de largo. Plumaje amarillo brillante. Pecho y costados con líneas rojas.



Hábitat: En bosques perturbados.

Alimentación: Insectos.

Estado de conservación: Menor preocupación a nivel mundial.

Distribución: De Alaska a Brasil.

Poblaciones en Guatemala: Migratorias.



CANDELITA NORTEÑA

Setophaga ruticilla (Linnaeus, 1758)



Características: Alrededor de 13 cm de largo. Plumaje negro con parches anaranjados en los costados. Hembras con plumaje gris.


Hábitat: En gran variedad de hábitats

Alimentación: Insectos, semillas y bayas.

Estado de conservación: Menor preocupación a nivel mundial.

Distribución: De Canadá a Ecuador.

Poblaciones en Guatemala: Migratorias.



REINITA DE TOWNSEND

Setophaga townsendi (Townsend, 1837)

Características: Alrededor de 13 cm de largo. Plumaje negro en corona, garganta y oídos; amarilla en el rostro. Pecho y costados amarillos con líneas negras.


Hábitat: En bosques de pino y encino, sabanas de pino.

Alimentación: Insectos, semillas.

Estado de conservación: Menor preocupación a nivel mundial.

Distribución: De Alaska a Costa Rica.

Poblaciones en Guatemala: Migratorias.



CHIPE DORSO VERDE •

Setophaga virens (Gmelin, 1789)



Características: Alrededor de 12 cm de largo. Plumaje verde oliva en la frente, corona, nuca y dorso. Garganta y pecho negros. Vientre blanco. Alas negras con barras blancas.


Hábitat: En bosques húmedos, siempre verdes, de pino y encino.

Alimentación: Insectos.

Estado de conservación: Menor preocupación a nivel mundial.

Distribución: De Canadá a Colombia y el Caribe.

Poblaciones en Guatemala: Migratorias.



CHIPE CABEZA GRIS*Vermivora ruficapilla* (Wilson, 1811)

Características: Alrededor de 12 cm de largo. Cabeza gris, mancha gris en la corona. Anillo ocular blanco. Dorso olivo. Garganta y pecho amarillo. Vientre amarillo con blanco.



Hábitat: En bosques húmedos a semiáridos.

Alimentación: Insectos.

Estado de conservación: Menor preocupación a nivel mundial.

Distribución: De Canadá a Bolivia y el Caribe.


Poblaciones en Guatemala: Residentes.





CHIPE CORONINEGRO •

Wilsonia pusilla (Wilson, 1811)



FAMILIA THRAUPIDAE

Picaflores, tangaras

Aves muy variadas en apariencia. Con plumaje colorido. Picos variados, desde delgados, hasta gruesos. Pueden estar en grupos con otras especies.

TANGARA ALIAMARILLA •

Thraupis abbas (Deppe, 1830)



Características: Alrededor de 18 cm de largo. Plumaje azulado en el dorso, olivo en la parte inferior. Con una máscara negra. Un parche amarillo en las alas.


Hábitat: En áreas perturbadas, bordes de bosque lluvioso y bosque semidecídulo.

Alimentación: Frutos e insectos.

Estado de conservación: Preocupación menor a nivel mundial.

Distribución: De México a Costa Rica.

Poblaciones en Guatemala: Residentes.



TANGARA AZULIGRIS •

Thraupis episcopus (Linneo, 1766)



Características: Alrededor de 18 cm de largo. Plumaje azul grisáceo. Cabeza más clara que el cuerpo. Alas azul oscuro. Pico grueso.


Hábitat: En áreas perturbadas y bordes de bosque.

Alimentación: Frutos e insectos.

Estado de conservación: Menor preocupación a nivel mundial.

Distribución: De México a Brasil.

Poblaciones en Guatemala: Residentes.



FAMILIA EMBERIZIDAE

Gorriones, rascadores y zacatoneros

Aves con plumaje opaco. Picos gruesos y cónicos.

ZACATANERO ROJIZO

Aimophila rufescens (Swainson, 1827)

Características: Alrededor de 18 cm de largo. Plumaje café en alas y cola. Parte inferior y cuello, grisáceos. Barras laterales café en la parte superior de la cabeza. Cejas blancas. Cola larga.


Hábitat: En bosques áridos y semiáridos, bordes de bosque de pino encino y bosques lluviosos.

Alimentación: Semillas, insectos, frutos.

Estado de conservación: Preocupación menor a nivel mundial.

Distribución: De México a Costa Rica.

Poblaciones en Guatemala: Residentes.



SEMILLERO TORCAZ

Sporophila torqueola (Bonaparte, 1850)



Características: Alrededor de 11 cm de largo. Plumaje negro en la cabeza, con un collar blanco. Alas con dos barras y punta blancas. Banda negra en el pecho.



Hábitat: En áreas abiertas y perturbadas.

Alimentación: Semillas.

Estado de conservación: Menor preocupación a nivel mundial.

Distribución: De Estados Unidos a Panamá.

Poblaciones en Guatemala: Residentes.



FAMILIA CARDINALIDAE

Colorines, tangeras, pico gruesos.

Pico grueso y ancho. Cuerpo robusto. Plumaje con colores llamativos.

PICOGORDO DEGOLLADO

Pheucticus ludovicianus (Linnaeus, 1766)



Características: Alrededor de 18 cm de largo. Plumaje negro en el dorso; blanco en el pecho y vientre. Rabadilla blanca, con manchas negras. Pecho con manchas rosa.



Hábitat: En bosques húmedos a semiáridos, plantaciones, jardines y áreas semi abiertas.

Alimentación: Insectos, semillas y frutos.

Estado de conservación: Preocupación menor a nivel mundial.

Distribución: De Canadá a Guayana Francesa y el Caribe.

Poblaciones en Guatemala: Migratorias.





PICOGRUESO AZUL

Passerina caerulea (Linnaeus, 1758)

Características: Alrededor de 17 cm de largo. Plumaje azul, con una franja café en el ala. Pico grande de gris. Hembras café.


Hábitat: En sabanas de pino, bosques espinosos.

Alimentación: Animales pequeños y plantas.

Estado de conservación: Menor preocupación a nivel mundial.

Distribución: De Estados Unidos a Costa Rica.

Poblaciones en Guatemala: Residentes.



COLORÍN SIETECOLORES

Passerina ciris (Linnaeus, 1758)

Características: Alrededor de 14 cm de largo. Plumaje colorido. Cabeza azul con anillo ocular rojo. Dorso verde brillante. Alas verdes con azul. Pecho y vientre, rojos. Las hembras con plumaje verde olivo en el dorso y amarillo en la parte inferior.


Hábitat: En ambientes perturbados con zonas abiertas como matorrales, plantaciones, pastizales, bordes de bosque.

Alimentación: Semillas e insectos.

Estado de conservación: Cerca de estar amenazada.

Distribución: De Estados Unidos a Panamá.

Poblaciones en Guatemala: Migratorias.



COLORÍN AZUL

Passerina cyanea (Linnaeus, 1766)



Características: Alrededor de 14 cm de largo. Plumaje con varios tonos de azul índigo. Alas más oscuras. Hembras y machos no reproductivos de color amarillo café.


Hábitat: En ambientes perturbados con zonas abiertas como matorrales, plantaciones, pastizales, bordes de bosque.

Alimentación: Semillas e insectos.

Estado de conservación: Cerca de estar amenazada.

Distribución: De Estados Unidos a Panamá.

Poblaciones en Guatemala: Migratorias.



TANGARA DORSO RAYADO*Piranga bidentata* (Swainson, 1827)

Características: Alrededor de 18 cm de largo. Plumaje naranja rojizo en la cabeza y dorso. Con auriculares oscuros. Alas y cola negras, con dos barras blancas. Pico gris.


Hábitat: En bosques de pino y encino, húmedos siempre verdes y plantaciones.

Alimentación: Frutos e insectos.

Estado de conservación: Preocupación menor a nivel mundial.

Distribución: De Estados Unidos a Panamá.

Poblaciones en Guatemala: Residentes.



TANGARA ENCINERA

Piranga flava (Vieillot, 1822)



Características: Alrededor de 20 cm de largo. Pico y mejillas grises. Macho con plumaje rojo, hembra con plumaje amarillo verdoso.


Hábitat: En bosques de pino y encino, húmedos siempre verdes y plantaciones.

Alimentación: Insectos, bayas y frutos.

Estado de conservación: Preocupación menor a nivel mundial.

Distribución: De Estados Unidos a Argentina.

Poblaciones en Guatemala: Residentes.



TANGARA OCCIDENTAL*Piranga ludoviciana* (Wilson, 1811)

Características: Alrededor de 18 cm de largo. Pico rosado, parte superior más oscura. Alas negras con dos barras amarillas. Macho con plumaje inferior amarillo, parte superior y alas negras. Hembra grisácea.


Hábitat: En bosques de coníferas y mixtos.

Alimentación: Insectos, frutos

Estado de conservación: Preocupación menor a nivel mundial.

Distribución: De Canadá a Panamá.

Poblaciones en Guatemala: Migratorias.





PIRANGA ROJA

Piranga rubra (Linnaeus, 1758)

Características: Alrededor de 18 cm de largo. Cuerpo completamente rojo. Pico amarillo. Hembras con plumaje olivo y amarillo, y pico gris.



Hábitat: En bosques de coníferas y mixtos.

Alimentación: Insectos, frutos

Estado de conservación: Preocupación menor a nivel mundial.

Distribución: De Canadá a Perú.

Poblaciones en Guatemala: Migratorias.



FAMILIA ICTERIDAE

Zanates, tordos, chorchas

Aves medianas, con pico grueso y puntiagudo. Alas y cola largas. En los machos, domina el negro, aunque algunas especies poseen plumaje contrastante anaranjado, rojo o amarillo. Poseen cantos ruidosos.

BOLSERO DORSIDORADO •

Icterus chrysater (Lesson, 1844)

Características: Alrededor de 20 cm de largo. Plumaje amarillo brillante en dorso y vientre. Alas, garganta y cara negras. Pico negro, con la base inferior azul grisáceo.



Hábitat: En bosques de pino encino, matorrales y plantaciones.

Alimentación: Néctar, frutos e insectos.

Estado de conservación: Preocupación menor a nivel mundial.

Distribución: De México a Colombia y Venezuela.

Poblaciones en Guatemala: Residentes.



CALANDRIA DE BALTIMORE

Icterus galbula (Linnaeus, 1758)




Características: Alrededor de 18 cm de largo. Cuerpo con plumaje anaranjado. Cabeza, pecho y espalda negros. Pico azul grisáceo. Hembras con plumaje moteado con verde olivo, negro y anaranjado.

Hábitat: En bosques áridos a semiáridos, bordes de bosques y jardines. **Alimentación:** Néctar, frutos e insectos.

Estado de conservación: Preocupación menor a nivel mundial.

Distribución: De Canadá a Bolivia.

Poblaciones en Guatemala: Migratorias.



CALANDRIA DE PECHO MOTEADO

Icterus pectoralis (Wagler, 1829)

Características: Alrededor de 22 cm de largo. Cuerpo con plumaje negro en el dorso y amarillo en la cabeza y vientre. Pecho con puntos negros. Alas negras, con plumas blancas. Cola negra con punta blanca.


Hábitat: En bosques áridos a semiáridos, áreas semiabiertas.

Alimentación: Néctar, frutos e insectos.

Estado de conservación: Preocupación menor a nivel mundial.

Distribución: De Estados Unidos a Costa Rica.

Poblaciones en Guatemala: Residentes.



TURPIAL CASTAÑO

Icterus spurius (Linnaeus, 1758)



Características: Alrededor de 18 cm de largo. Cuerpo con plumaje negro en el dorso, cabeza, alas y cola. Parte inferior café. Las hembras con dorso amarillo olivo y vientre verde limón.


Hábitat: En bordes de bosques y áreas abiertas y perturbadas.

Alimentación: Flores e insectos.

Estado de conservación: Preocupación menor a nivel mundial.

Distribución: De Estados Unidos a Colombia.

Poblaciones en Guatemala: Migratorias.



BOLSERO DE WAGLER*Icterus wagleri* (Sclater, 1857)

Características: Alrededor de 22 cm de largo. Cuerpo con plumaje negro en la cabeza, espalda alta, alas y cola. Espalda baja y parte superior del ala, amarillas.



Hábitat: En bordes de bosques de pino y encino, semidecíduos y nubosos.

Alimentación: Flores, frutos, insectos.

Estado de conservación: Preocupación menor a nivel mundial.

Distribución: De México a Nicaragua.

Poblaciones en Guatemala: Residentes.





VAQUERO OJIRROJO •

Molothrus aeneus (Wagler, 1829)



Características: Alrededor de 20 cm de largo. Cuerpo con plumaje negro brillante, con plumas verde bronce en la cabeza. Alas y cola con brillo azulado. Hembras con cuerpo café oscuro.

Hábitat: En áreas abiertas, bordes de bosque y plantaciones.



Alimentación: Granos, insectos.

Estado de conservación: Preocupación menor a nivel mundial.

Distribución: De Estados Unidos a Panamá.

Poblaciones en Guatemala: Residentes.



ZANATE

Quiscalus mexicanus (Gmelin, 1788)

Características: Alrededor de 40 cm de largo. Cuerpo con plumaje negro azulado brillante. Ojos amarillos. Pico y patas negras. Cola muy larga. Hembra con plumaje café oscuro con pecho y vientre canela.


Hábitat: En áreas abiertas, plantaciones, pueblos. Ausente en desiertos y bosques muy cerrados.

Alimentación: Omnívoro.

Estado de conservación: Preocupación menor a nivel mundial.

Distribución: De Estados Unidos a Bolivia.

Poblaciones en Guatemala: Residentes.



PRADERO COMÚN

Sturnella magna (Gmelin, 1788)



Características: Alrededor de 22 cm de largo. Cuerpo con plumaje rayado café negruzco y beige; amarillo en la garganta y la parte inferior. Pecho con una banda negra en forma de U. costados y parte inferior de la cola amarillo con rayas negras. Alas con barras negras y cafés. Línea beige sobre y debajo de los ojos. Línea negra post ocular.


Hábitat: En praderas y áreas agrícolas abiertas.

Alimentación: Insectos, semillas, frutos.

Estado de conservación: Preocupación menor a nivel mundial.

Distribución: Del sur de Canadá a Suramérica.

Poblaciones en Guatemala: Residentes.



FAMILIA PASSERELLIDAE

Gorriónes

GORRIÓN COMÚN

Zonotrichia capensis (Müller, 1776)

Características: Alrededor de 14 cm de largo. Plumaje pardo en el dorso, con manchas negras. Vientre y pecho blanquecinos. Alas y cola cafés. Cara gris con líneas negras en la corona, ojo y bigote. Pico oscuro en la parte superior y gris en la parte inferior.



Hábitat: En áreas abiertas y semiabiertas, pueblos y bosques de pino.

Alimentación: Semillas, insectos, frutos.

Estado de conservación: Preocupación menor a nivel mundial.

Distribución: De México a Argentina y el Caribe.

Poblaciones en Guatemala: Residentes.



FAMILIA REGULIDAE

Reyezuelos

Aves pequeñas, con pico y patas negras. Cuerpo color oliva en el dorso y blanco en el vientre. Construyen nidos con musgos, líquenes y fibras.

REYEZUELO MATRAQUITA

Regulus calendula (Linnaeus, 1766)



Características: Alrededor de 10 cm de largo. Plumaje gris olivo en la cabeza y dorso. Parche rojo en la corona. Anillo ocular blanco. Garganta y pecho grises. Alas y cola negra con dos bandas blancas. Punta de las alas amarillas. Línea negra en la base de las alas.


Hábitat: En bosques áridos a semihúmedos y matorrales..

Alimentación: Insectos.

Estado de conservación: Preocupación menor a nivel mundial.

Distribución: De Canadá a Guatemala y el Caribe.

Poblaciones en Guatemala: Residentes.



APÉNDICE

GUÍA DE MAMÍFEROS

◆◆◆◆

Durante los tres años de Monitoreo de Vida Silvestre, en la Mina Marlin y áreas aledañas, se han registrado al menos diez especies de mamíferos, de siete familias y cuatro órdenes.

ORDEN DIDELPHIMORPHIA

FAMILIA DIDELPHIDAE

Zarigüeyas, tacuacines



ORDEN CINGULATA

FAMILIA DASYPODIDAE

Armadillos



ORDEN CARNIVORA

FAMILIA CANIDAE

Zorros, coyotes



ORDEN RODENTIA: **Familia Sciuridae**

FAMILIA MEPHITIDAE

Zorrillos



ORDEN RODENTIA

FAMILIA SCIURIDAE

Ardillas



BIBLIOGRAFÍA Y REFERENCIAS RECOMENDADAS



- BirdLife International. (2016). The IUCN Red List of Threatened Species. www.iucnredlist.org.
- Cano, E.B. (2006). Biodiversidad de Guatemala. Vol. I. Universidad del Valle de Guatemala, Guatemala.
- Fagan, J., Komar, O. (2016). Peterson Field Guide to Birds of Northern Central America. Peterson Field Guides.
- Howell, S., Webb, S. (1995). A guide to the birds of Mexico and Northern Central America. Oxford University Press, Oxford, United Kingdom.
- National Audubon Society. (2018). Guía de Aves de América del Norte. www.audubon.org/es/guia-de-aves/
- Smithsonian Institution Libraries Washington, D.C. 2004. Electronic Biologia Centrali-Americana. Digital Edition 2004. www.sil.si.edu/digitalcollections/bca/.

RESUMEN DE GRUPOS



CLASE AVES

ORDEN ANSERIFORMES

Familia Anatidae

ORDEN PODICIPEDIFORMES

Familia Podicipedidae

ORDEN COLUMBIFORMES

Familia Columbidae

ORDEN CUCULIFORMES

Familia Cuculidae

ORDEN APODIFORMES

Familia Apodidae

Familia Trochilidae

ORDEN PELECANIFORMES

Familia Pelecanidae

Familia Ardeidae

ORDEN CHARADRIIFORMES

Familia Charadriidae

Familia Laridae

Familia Recurvirostridae

Familia Scolopacidae

ORDEN ACCIPITRIFORMES

Familia Cathartidae

Familia Accipitridae

ORDEN STRIGIFORMES

Familia Strigidae

ORDEN CAPRIMULGIFORMES

Familia Caprimulgidae

ORDEN TROGONIFORMES

Familia Trogonidae

ORDEN CORACIIFORMES

Familia Momotidae

Familia Alcedinidae

ORDEN PICIFORMES

Familia Picidae

ORDEN FALCONIFORMES

Familia Falconidae

ORDEN PSITTACIFORMES

Familia Psittacidae

ORDEN PASSERIFORMES

Familia Tyrannidae

Familia Vireonidae

Familia Corvidae

Familia Hirundinidae

Familia Aegithalidae

Familia Troglodytidae

Familia Mimidae

Familia Ptilogonatidae

Familia Fringillidae

Familia Parulidae

Familia Thraupidae

Familia Emberizidae

Familia Cardinalidae

Familia Icteridae

Familia Passerellidae

Familia Regulidae

CLASE MAMMALIA

ORDEN DIDELPHIMORPHIA

Familia Didelphidae

ORDEN CINGULATA

Familia Dasypodidae

ORDEN CARNIVORA

Familia Canidae

Familia Mephitidae

ORDEN RODENTIA

Familia Sciuridae

ÍNDICE ALFABÉTICO



Accipitridae	46
ACCIPITRIFORMES	44
Aegithalidae	88
Alcedinidae	55
<i>Aimophila rufescens</i>	123
<i>Amazilia cyanocephala</i>	28
<i>Anas discors</i>	17
Anatidae	17
ANSERIFORMES	17
<i>Antrastomus arizonae</i>	51
<i>Ardea alba</i>	32
Ardeidae	32
Apodidae	27
APODIFORMES	27
<i>Aspatha gularis</i>	54
<i>Basileuterus rufifrons</i>	101
<i>Bubo virginianus</i>	50
<i>Butorides virescens</i>	33
<i>Buteo albonotatus</i>	46
<i>Buteo jamaicensis</i>	47
<i>Buteo platypterus</i>	48
<i>Buteo swainsoni</i>	49
<i>Calidris bairdii</i>	37
<i>Calidris mauri</i>	38
<i>Calidris minutilla</i>	39
<i>Calidris pusilla</i>	40
Campylorhynchus	
<i>zonatus</i>	89
Caprimulgidae	51
CAPRIMULGIFORMES	51
<i>Cardellina canadensis</i>	102
<i>Cardellina rubrifrons</i>	102
Cardinalidae	125
<i>Cathartes aura</i>	44
Cathartidae	44
Charadriidae	34
CHARADRIIFORMES	34
<i>Charadrius vociferus</i>	34
<i>Chloroceryle americana</i>	55

<i>Chordeiles acutipennis</i>	52
<i>Colaptes auratus</i>	57
<i>Colaptes rubiginosus</i>	58
<i>Colibri thalassinus</i>	29
Columbidae	19
COLUMBIFORMES	19
<i>Columbina inca</i>	19
<i>Contopus cinereus</i>	64
<i>Contopus pertinax</i>	65
<i>Contopus sordidulus</i>	66
<i>Contopus virens</i>	67
CORACIIFORMES	54
<i>Coragyps atratus</i>	45
<i>Corduelis notata</i>	97
<i>Corduelis psaltria</i>	98
Corvidae	85
<i>Crotophaga sulcirostris</i>	24
Cuculidae	24
CUCULIFORMES	24
<i>Cyanocitta stelleri</i>	85
<i>Cyanocorax</i>	
<i>melanocyaneus</i>	86
<i>Cyclarhis gujanensis</i>	79
<i>Dryocopus lineatus</i>	59
EMBERIZIDAE	123
<i>Empidonax affinis</i>	68
<i>Empidonax albigularis</i>	69
<i>Empidonax fulvifrons</i>	70
<i>Empidonax traillii</i>	71
<i>Euphonia elegantissima</i>	99
<i>Falco sparverius</i>	62
Falconidae	62
FALCONIFORMES	62
Fringillidae	97
<i>Geococcyx velox</i>	25
<i>Geothlypis philadelphia</i>	103
<i>Geothlypis poliocephala</i>	104
<i>Geothlypis trichas</i>	105
<i>Helmitheros vermivorum</i>	106

<i>Himantopus mexicanus</i>	36
Hirundinidae	87
<i>Hylocharis leucotis</i>	30
<i>Icteria virens</i>	106
Icteridae	133
<i>Icterus chrysater</i>	133
<i>Icterus galbula</i>	134
<i>Icterus pectoralis</i>	135
<i>Icterus spurius</i>	136
<i>Icterus wagleri</i>	137
Laridae	35
<i>Leptotila verreauxi</i>	20
<i>Leucophaeus atricilla</i>	35
<i>Loxia curvirostra</i>	100
MAMÍFEROS	143
<i>Melanerpes aurifrons</i>	56
<i>Melanerpes formicivorus</i>	60
<i>Melanotis hypoleucus</i>	94
Mimidae	94
<i>Mimus gilvus</i>	95
<i>Mitrephanes phaeocercus</i>	72
<i>Mniotilta varia</i>	107
<i>Molothrus aeneus</i>	138
Momotidae	54
<i>Myioborus pictus</i>	108
<i>Oporornis tolmiei</i>	109
<i>Oreothlypis peregrina</i>	110
<i>Parula superciliosa</i>	110
Parulidae	101
Passerellidae	141
PASSERIFORMES	64
<i>Passerina caerulea</i>	126
<i>Passerina ciris</i>	127
<i>Passerina cyanea</i>	128
<i>Patagioenas fasciata</i>	21
Pelecanidae	31
PELECANIFORMES	31
<i>Pelecanus</i>	31
<i>Phalaropus tricolor</i>	41
<i>Pheucticus ludovicianus</i>	125
<i>Piaya cayana</i>	26
Picidae	56
PICIFORMES	56
<i>Piranga bidentata</i>	129

<i>Piranga flava</i>	130
<i>Piranga ludoviciana</i>	131
<i>Piranga rubra</i>	132
Podicipedidae	18
PODICIPEDIFORMES	18
<i>Psaltiriparus minimus</i>	88
<i>Psittacara strenuus</i>	63
Psittacidae	63
PSITTACIFORMES	63
Ptilonotidae	96
<i>Ptilonotus cinereus</i>	96
<i>Pyrocephalus rubinus</i>	73
<i>Quiscalus mexicanus</i>	139
Recurvirostridae	36
Regulidae	142
<i>Regulus calendula</i>	142
<i>Salpinctes obsoletus</i>	90
<i>Sayornis nigricans</i>	74
Scolopacidae	37
<i>Setophaga chrysoparia</i>	111
<i>Setophaga coronata</i>	112
<i>Setophaga dominica</i>	111
<i>Setophaga fusca</i>	113
<i>Setophaga graciae</i>	114
<i>Setophaga magnolia</i>	114
<i>Setophaga petechia</i>	115
<i>Setophaga ruticilla</i>	116
<i>Setophaga townsendi</i>	117
<i>Setophaga virens</i>	118
<i>Sialia sialis</i>	91
<i>Sphyrapicus varius</i>	61
<i>Sporophila torqueola</i>	124
<i>Stelgidopteryx</i>	
<i>serripennis</i>	87
<i>Streptoprocne zonaris</i>	27
Strigidae	50
STRIGIFORMES	50
<i>Sturnella magna</i>	140
<i>Tachybaptus dominicus</i>	18
Thraupidae	121
<i>Thraupis abbas</i>	121
<i>Thraupis episcopus</i>	122
<i>Tringa melanoleuca</i>	42
<i>Tringa solitaria</i>	43

Trochilidae	28
Troglodytidae	89
<i>Trogon mexicanus</i>	53
Trogonidae	53
TROGONIFORMES	53
Turdidae	91
<i>Turdus grayi</i>	92
<i>Turdus rufitorques</i>	93
Tyrannidae	64
<i>Tyrannus forficatus</i>	75
<i>Tyrannus melancholicus</i>	76
<i>Tyrannus tyrannus</i>	77
<i>Tyrannus verticalis</i>	78
<i>Vermivora ruficapilla</i>	119
<i>Vireo belii</i>	80
<i>Vireo flavoviridis</i>	81
<i>Vireo huttoni</i>	82
<i>Vireo plumbeus</i>	83
<i>Vireo solitarius</i>	84
Vireonidae	79
<i>Wilsonia pusilla</i>	120
<i>Zenaida asiatica</i>	22
<i>Zenaida macroura</i>	23
<i>Zonotrichia capensis</i>	141



ISBN: 978-9929-720-07-7



9 789929 720077